

Patientenkarte

Tragen Sie diese Karte immer bei sich und zeigen Sie sie allen Angehörigen der Heilberufe, die Sie behandeln

Wichtige Sicherheitsinformation zu Forxiga 5 mg (Dapagliflozin) – nur für Typ-1-Diabetes mellitus

Anzeichen einer DKA beinhalten:

Mund und Bauch: Übelkeit oder Erbrechen, Bauchschmerzen, übermäßiger Durst/trockener Mund (Anzeichen eines Flüssigkeitsmangels), süßlicher oder metallischer Geschmack im Mund.

Atem, Atmung und Geruch: Schnelle und tiefe Atmung, süßlicher Geruch des Atems, veränderter Geruch von Urin oder Schweiß.

Andere Anzeichen: Erhöhte Mengen an Ketonkörpern in Urin oder Blut, Verwirrtheit, ungewöhnliche Schläfrigkeit oder Müdigkeit.

Falls Sie Anzeichen einer DKA haben, folgen Sie Ihrem DKA Management Plan:

1. _____
2. _____
3. _____

Setzen Sie Dapagliflozin ab und gehen Sie unverzüglich in ein Krankenhaus, wenn:

Kontaktinformation für Sie und Ihren Arzt:



Ihr Name:

Name des Arztes:

Telefonnummer des Arztes:

Beginn der Dapagliflozin Behandlung (Datum):

Notfallkontakt (Verwandter oder Bekannter):

Telefonnummer Notfallkontakt:



Dieser Patient hat einen Typ-1-Diabetes mellitus und wird zusätzlich zu Insulin mit Forxiga 5 mg (Dapagliflozin) behandelt.

Unter Dapagliflozin ist das Risiko für das Auftreten einer diabetischen Ketoazidose (DKA) erhöht.

Achtung: eine DKA unter SGLT2-Inhibitoren wie Dapagliflozin kann auch bei Blutzuckerspiegeln unter 14 mmol/l (250 mg/dl) auftreten.

Daher ist die Diagnose einer DKA unabhängig vom Blutzuckerspiegel durchzuführen.

Vor einem operativen Eingriff oder im Fall einer Hospitalisierung aufgrund einer akuten, schweren Erkrankung muss die Therapie mit Dapagliflozin 5 mg unterbrochen werden.

- **Bei Verdacht auf eine DKA** ist Dapagliflozin sofort abzusetzen.
- **Die Behandlung einer DKA** kann beinhalten: Insulin, Flüssigkeit, zusätzliche Kohlenhydrate – insbesondere, wenn der Blutzuckerspiegel nicht deutlich erhöht ist.

Beenden oder unterbrechen Sie unter keinen Umständen die Insulintherapie.

Diese Patientenkarte, die Patienten-
broschüre und die Gebrauchsinformation
sind online abrufbar unter:
<https://www.frx-schulungsmaterial.de>