

## Tájékoztató egészségügyi szakemberek számára

Ez a beteg 1-es típusú diabetes mellitus miatt dapagliflozin-kezelésben (SGLT-2 gátló) részesül az inzulinkezelés kiegészítésére.

A dapagliflozin-kezelést átmenetileg le kell állítani műtéti beavatkozás előtt, vagy súlyos, akut betegség miatti kórházi kezelés esetén.

**Amennyiben DKA tünetei jelentkeznek, azonnal vizsgálja a beteget diabéteszes ketoacidózis irányába**

- Értelmezze a DKA-t függetlenül a vércukorszinttől.
- A dapagliflozin-kezelés során DKA kialakulhat alacsonyabb (14 mmol/l alatti) vércukorszintek esetén is. Ezt nevezik „euglikémiás diabéteszes ketoacidózisnak”.

### DKA kezelése

- **DKA gyanúja esetén:** helyezze a beteget azonnal orvosi felügyelet alá és azonnal állítsa le a dapagliflozin-kezelést.
- **Euglikémiás DKA kezelésekor szükséges lehet: fokozott szénhidrát bevitel, továbbá inzulin adása és folyadékpótlás**

**Semmilyen körülmények között ne állítsa le az inzulinkezelést, illetve ne szakítsa meg azt.**

Ez a tájékoztató, az Útmutató betegek és gondozók részére és a beteg-tájékoztató elérhető online az alábbi címen:  
<http://www.az-diabetesz.hu>

AstraZeneca 

HU-1822, Lezárás dátuma: 2019.07.11.

## BETEGEKNEK SZÓLÓ FIGYELMEZTETŐ KÁRTYA

Kérjük, mindig tartsa magánál  
ezt a kártyát és  
mutassa meg az orvosnak.

**Forxiga-(dapagliflozin) kezeléssel  
kapcsolatos fontos gyógyszer-  
biztonsági információ –  
kizárólag 1-es típusú diabétesz esetén**

AstraZeneca 

## A DKA tünetei:

**Száj és gyomor:** Hányinger vagy hányás, gyomorfájás, kínzó szomjúság, illetve szájszárazság (a dehidráció tünetei), édes, vagy fémes íz érzése a szájbán

**Lehelet, légzés és szag:** Gyors és mély légvételek, a lehelet jellegzetes édeskés illatú, a vizelet és az izzadság szaga eltér a megszokottól.

**Egyéb tünetek:** A ketontestek szintje emelkedett a vizeletben, vagy a vérben, gyors testsúlyvesztés, zavartság, szoktalan álmoság vagy fáradtság érzése.

Ha a DKA tüneteit észleli magán, keresse fel kezelőorvosát, vagy a legközelebbi kórházat és azonnal hagyja abba a Forxiga szedését.

### Emlékeztető:

A Forxiga-kezelés során DKA kialakulhat alacsonyabb (14 mmol/ alatti) vércukorszintek esetén is!

AstraZeneca 

Az Ön és kezelőorvosa  
kapcsolattartási adatai



Az Ön neve:

---

Kezelőorvos neve:

---

Kezelőorvos telefonszáma:

---

A Forxiga-kezelés megkezdésének dátuma:

---

Sürgős esetben értesítendő:

---

Telefonszám:

---