

# Waarschuwingskaart voor patiënten

Draag deze kaart altijd bij u en laat deze zien  
aan alle zorgverleners die u bezoekt

## **Belangrijke veiligheidsinformatie over dapagliflozine – alleen voor diabetes type 1**

### **Verschijnselen van een DKA zijn onder andere:**

**Mond en maag:** misselijkheid of overgeven,  
buikpijn, veel dorst/droge mond (tekenen van  
uitdroging), zoete of metaalachtige smaak in uw  
mond.

**Adem, ademhaling en geur:** snelle en diepe  
ademhaling, zoete geur van uw adem, uw urine of  
zweet ruiken anders.

**Andere verschijnselen:** verhoogde  
ketonenwaarden in uw urine of bloed, snel  
gewichtsverlies, verwardheid, ongebruikelijke  
slaperigheid of vermoeidheid.

**Als u verschijnselen/klachten van een DKA  
heeft, neem dan contact op met uw arts of ga  
direct naar het ziekenhuis. Stop meteen met  
het gebruik van dapagliflozine.**

**Onthoud:** Bij patiënten die dapagliflozine gebruiken, kan  
er zelfs sprake zijn van een DKA als de bloedsuikerspiegels  
lager dan 14 mmol/l zijn (250 mg/dl). Dit heet 'euglykemische  
DKA'.

## Contactinformatie voor u en uw arts



Uw naam:

---

Naam arts:

---

Telefoonnummer van de arts:

---

Datum dat behandeling met dapagliflozine is  
gestart:

---

Familieid of vriend om in noodgeval contact  
mee op te nemen:

---

Telefoonnummer van familieid of vriend:

---



## Deze patiënt neemt dapagliflozine voor diabetes mellitus type 1

### Controleer patiënten onmiddellijk op een diabetische ketoacidose (DKA) als er verschijnselen van een DKA zijn

- Controleer op een DKA ongeacht de bloedglucosespiegel.
- Bij patiënten die dapagliflozine gebruiken, kan er zelfs sprake zijn van een DKA als de bloedsuikerspiegels lager dan 14 mmol/l zijn (250 mg/dl). Dit heet 'euglykemische DKA'.

### Behandeling van een DKA

- **Als u een DKA vermoedt:** zoek onmiddellijk medische hulp voor de patiënt en stop onmiddellijk met dapagliflozine.
- **Voor de behandeling van een euglykemische DKA is het volgende nodig:** extra koolhydraten naast insuline en vloeistof.

**Stop of onderbreek onder geen enkele omstandigheid de behandeling met insuline.**

Dit materiaal, de brochure voor patiënten en verzorgers, en de patiëntenbijsluiter (Patient Information Leaflet, PIL) zijn online beschikbaar op: [www.rmm-forxiga-patient.nl](http://www.rmm-forxiga-patient.nl)